

Syrphidae (Diptera) fauna in Tokat provinces (Turkey)*

Demet CANDEMİR**

Kenan KARA**

Summary

28 species of Syrphidae, belonging to 16 genus, are listed and annotated the locations previously found in Turkey. Also it was added the distribution in the world. The Material examined is deposited in Plant Protection Department of the Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.

Key words: Syrphidae, Fauna, Diptera, Tokat, Turkey

Anahtar sözcükler: Syrphidae, Fauna, Diptera, Tokat, Türkiye

Introduction

The family Syrphidae, known as 'Flower flies or Hover flies' is distributed almost the whole world. Larvae of some genera of this family are predators on aphids. Larvae of other genera are phytophagous, saprophagous, carpophagous, and microphagous. Adults are found on flowers especially Umbelliferae species, also the adults of this family are one of the most important pollinators beside the bees (Sımcı & Glumac, 1987). The Syrphidae comprises about 5000 species in the world, 1600 species in the Palearctic region. About 730 species have been mentioned from Mediterranean area (Weyer & Dils, 1999). Only limited knowledge is available especially on Syrphidae in Turkey (Özgür, 1982, 1986a, 1986b, 1987; Alaoğlu & Özbek, 1987; Hayat & Alaoğlu 1990a, 1990b; Pehlivan & Akbulut, 1990; Sarıbiyık & Aktaş, 1996, Hurkmans & Hayat 1997; Sarıbiyık & Hasbenli, 1997; Sarıbiyık 2001). Other works done on syrphids in Turkey are about the determination of the natural enemies of certain insect species.

* Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 28.03.2002 tarihinde Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 60250 Tokat, Turkey
e-mail: kkara@gop.edu.tr
Alınış (Received): 13.01.2003

Materials and Methods

The Material studied were collected from different parts of Tokat in 2000 and 2001 by trap. The flies were killed, pinned and prepared for identification. Identifications were made by Dr. Rüstem HAYAT.

Results

Tribus: Syrphini

Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)

Material examined: Zile (Karayün, 27.06.2000, 6 ♂; Kireçli, 19.06.2000, 1 ♂; Ede, 06.06.2000, 1 ♀; 28.06.2001, 1 ♀), Tokat (28.04.1999, 3 ♂; Çördük, 10.08.2000, 1 ♂, 1 ♀; 05.07.2001, 8 ♀; Söngüt, 14.08.2000, 3 ♀; 11.07.2001, 1 ♂, 13 ♀; Dökmetepe, 14.08.2000, 2 ♀; Akyamaç, 26.05.2000, 1 ♂; 05.06.2000, 3 ♂, 6 ♀; 30.05.2001, 1 ♀; 01.06.2001, 2 ♂, 1 ♀), Almus (Serince, 26.05.2000, 3 ♂, 1 ♀; 01.08.2001, 1 ♂, 1 ♀; Bakımlı, 07.06.2000, 1 ♂; 22.08.2001, 5 ♀; Gevrek, 14.08.2001, 1 ♀), Niksar (Şahinli, 27.06.2000, 1 ♂, 3 ♀; 22.07.2001, 1 ♀; Musapınarı, 27.06.2000, 5 ♂, 1 ♀; Çerköy, 27.06.2000, 1 ♂), Artova (Yağcımus, 22.06.2001, 1 ♂), Turhal (Çaylı, 03.07.2000, 3 ♂; Çivril, 27.05.2001, 3 ♀; Kalaycık, 28.05.2001, 1 ♀), Pazar (Erkilet, 06.06.2000, 1 ♂, 3 ♀; Dereköy, 19.06.2000, 2 ♀), Reşadiye (10.08.2000, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara, Adana (Tuatay et al., 1972); İzmir (Soydanbay, 1976); Ankara (Düzgüneş et al., 1982); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Erzurum (Alaoğlu & Özbek, 1987); Kayseri, Kastamonu (Saribıyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, Asia, North Africa, Oriental Region and Australia (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)

Material examined: Tokat (28.04.1999, 1 ♂, 1 ♀).

Distribution in Turkey: İzmir (Soydanbay, 1976); Mersin (Özgür, 1986); Kastamonu (Saribıyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, Nearctic Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Metasyrphus corollae Fabricius, 1794

Material examined: Zile (Ede, 06.06.2000, 2 ♀), Tokat (20.04.1999, 1 ♂, 1 ♀; 02.08.1999, 3 ♂, 4 ♀; 20.07.1999, 1 ♂, 2 ♀; Dökmetepe, 14.08.2000, 1 ♂; Akyamaç, 05.06.2000, 1 ♀), Reşadiye (10.08.2000, 1 ♀), Artova (Aktaş, 04.06.1999, 1 ♀), Almus (Bakımlı, 07.06.2000, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972); İzmir (Soydanbay, 1976); Ankara (Düzgüneş et al., 1982); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984);

Akdeniz region (Özgür 1986); Erzurum (Alaoğlu & Özbek 1987); Erzurum (Hayat & Alaoğlu 1990a).

Distribution in the world: All parts of Europe, USSR, Asia, North Africa, Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Scaeva selenitica (Meigen, 1822)

Material examined: Tokat (20.03.1999, 2 ♂; 28.04.1999, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Turkey (no locality) (Sack, 1932); Izmir (Gadeau De Kerville, 1939); Ankara (Düzgüneş et al., 1982); Izmir (Erkin, 1983).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)

Material examined: Tokat (20.03.1999, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Düzgüneş et al., 1982); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1983); Adana, Antakya (Özgür, 1986); Çukurova (Zeren, 1989); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990a); Kayseri, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Scaeva dignota (Rondani, 1857)

Material examined: Tokat (07.11.2001, 1 ♂), Niksar (Musapınarı, 16.07.2001, 1 ♂), Zile (Ede, 11.07.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Turkey (no locality) (Peck, 1988); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990a).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Scaeva pyrastris (Linnaeus, 1758)

Material examined: Tokat (Söngüt, 14.08.2000, 1 ♂, 2 ♀; 11.07.2001, 2 ♂, 4 ♀; Akyamaç, 05.06.2000, 2/3; 26.05.2000, 1 ♂; 30.05.2001, 3 ♀; Çördük, 05.07.2001, 1 ♂, 2 ♀; Dökmetepe, 14.08.2000, 1 ♂, 2 ♀; 01.06.2001, 2 ♂); Artova (Aktaş, 03.08.2000, 3 ♂, 4 ♀; Yağcımusa, 03.08.2000, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Ankara, Adana (Tuatay et al., 1972); Ankara (Düzgüneş et al., 1982); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984); Akdeniz region (Özgür, 1986); Erzurum (Alaoğlu & Özbek 1987).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa, Nearctic Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843)

Material examined: Tokat (28.04.1999, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Adana (Özgür, 1986).

Distribution in the world: All parts of Europe, USSR, Asia, Nearctic and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

Material examined: Turhal (Çivril, 27.05.2001, 2 ♂; 19.06.2001, 4 ♂, 2 ♀; Kalaycık, 14.08.2000, 2 ♂, 1 ♀; 28.05.2001, 1 ♂; Çaylı, 03.07.2000, 1 ♂; 08.08.2000, 3 ♀; 25.05.2001, 3 ♂, 2 ♀), Zile (Kireçli, 19.06.2000, 1 ♂, 5 ♀; 01.07.2001, 3 ♂; Karayün, 27.06.2000, 3 ♂, 1 ♀; 18.06.2001, 1 ♂, 1 ♀; Ede, 28.06.2001, 2 ♀), Tokat (Dökmektepe, 14.08.2000, 2 ♀; 01.06.2001, 4 ♂; 11.06.2001, 1 ♀; Akyamaç, 26.05.2000, 1 ♀; 30.05.2001, 5 ♀; Çördük, 10.08.2000, 2 ♂, 2 ♀; 05.07.2001, 9 ♀; Söngüt, 14.08.2000, 4 ♂, 6 ♀; 11.07.2001, 18 ♀), Artova (Aktaş, 03.08.2000, 19 ♀; 05.06.2000, 12 ♀; 20.06.2001, 2 ♂, 2 ♀; Kabatepe, 03.08.2000, 1 ♂; 14.06.2001, 1 ♂; Yağcımusa, 03.08.2000, 1 ♀), Almus (Bakımlı, 07.06.2000, 1 ♂, 5 ♀; 22.08.2001, 12 ♀; Serince, 26.05.2000, 1 ♂; 01.08.2001, 1 ♀; Gevrek, 19.06.2000, 6 ♂, 1 ♀; 14.08.2001, 1 ♂, 6 ♀), Reşadiye (10.08.2000, 3 ♀), Niksar (Musapınarı, 27.06.2000, 5 ♀; 16.07.2001, 2 ♀; Şahinli, 27.06.2000, 7 ♀; 22.07.2001, 2 ♀; Çerköy, 27.06.2000, 7 ♀; 18.07.2001, 10 ♀), Pazar (Dereköy, 19.06.2000, 6 ♀; Erkiilet, 06.06.2000, 2 ♀).

Distribution in Turkey: Kayseri (Bischof, 1902); Ankara, İzmir (Gadeau de Kerville, 1939); Ankara (Tuatay et al., 1972; Düzgüneş et al., 1982); Marmara Region (Atak, 1975); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Erzurum (Alaoğlu & Özbek, 1987); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990a); Kayseri, Kahramanmaraş, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa, Nearctic and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Sphaerophoria turkmenica Bankowska, 1964

Material examined: Turhal (Çivril, 27.05.2001, 2 ♂; 19.06.2001, 4 ♂, 2 ♀; Kalaycık, 14.08.2000, 2 ♂, 1 ♀; 28.05.2001, 1 ♂; Çaylı, 03.07.2000, 1 ♂; 08.08.2000, 3 ♀; 25.05.2001, 3 ♂, 2 ♀), Zile (Kireçli, 19.06.2000, 1 ♂, 5 ♀; 01.07.2001, 3 ♂; Karayün, 27.06.2000, 3 ♂, 1 ♀; 18.06.2001, 1 ♂, 1 ♀; Ede, 28.06.2001, 2 ♀), Tokat (Dökmektepe, 14.08.2000, 2 ♀; 01.06.2001, 4 ♂; 11.06.2001, 1 ♀; Akyamaç, 26.05.2000, 1 ♀; 30.05.2001, 5 ♂; Çördük, 10.08.2000, 2 ♂, 2 ♀; 05.07.2001, 9 ♀; Söngüt, 14.08.2000, 4 ♂, 6 ♀; 11.07.2001, 18 ♀), Artova (Aktaş, 03.08.2000, 19 ♀; 05.06.2000, 12 ♀; 20.06.2001, 2 ♂, 2 ♀; Kabatepe, 03.08.2000, 1 ♂; 14.06.2001, 1 ♂; Yağcımusa, 03.08.2000, 1 ♀), Almus (Bakımlı, 07.06.2000, 1 ♂, 5 ♀; 22.08.2001, 12 ♀; Serince, 26.05.2000, 1 ♂; 01.08.2001, 1 ♀; Gevrek, 19.06.2000, 6 ♂, 1 ♀;

14.08.2001, 1 ♂, 6 ♀), Reşadiye (10.08.2000, 3 ♀), Niksar (Musapınarı, 27.06.2000, 5 ♀; 16.07.2001, 2 ♀; Şahinli, 27.06.2000, 7 ♀; 22.07.2001, 2 ♀; Çerköy, 27.06.2000, 7 ♀; 18.07.2001, 10 ♀), Pazar (Dereköy, 19.06.2000, 6 ♀; Erkilet, 06.06.2000, 2 ♀).

Distribution in Turkey: Erzurum (Hayat, 1989).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830)

Material examined: Almus (Gevrek, 14.08.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara, Kırıkkale (Düzgüneş et al., 1982); İzmir (Erkin 1983); Adana, Antakya, İçel, Osmaniye (Özgür, 1987).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Tribus: Chrysotoxini

Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)

Material examined: Artova (04.06.1999, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Erzurum (Hurkmans & Hayat, 1997).

Distribution in the world: Europe, USSR (Peck, 1988).

Biology: Unknown.

Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822

Material examined: Tokat (02.10.1999, 1 ♂)

Distribution in Turkey: Kayseri (Bischof, 1902); Turkey (no locality) (Sack, 1932); İzmir (Gadeau de Kerville, 1939); Kayseri, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Unknown.

Chrysotoxum parmense Rondani, 1845

Material examined: Tokat (12.07.2001, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Adana (Özgür, 1987); Kayseri (Sarıbiyık & Aktaş, 1996); Erzurum (Hurkmans & Hayat, 1997).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia (Peck, 1988).

Biology: Unknown.

Tribus: Melanostomatini

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)

Material examined: Tokat (Söngüt, 14.08.2000, 1 ♂, 2 ♀; 11.07.2001, 2 ♂, 4 ♀; Akyamaç, 05.06.2000, 2 ♂, 3 ♀; 26.05.2000, 1 ♂; 30.05.2001, 3 ♀;

Çördük, 05.07.2001, 1 ♂, 2 ♀; Dökmetepe, 14.08.2000, 1 ♂, 2 ♀; .06.2001, 2 ♂), Artova (Aktaş, 03.08.2000, 3 ♂, 4 ♀; Yağcımus, 03.08.2000, 1 ♀), Zile (Kireçli, 19.06.2000, 3 ♂, 1 ♀; Karayün, 18.06.2001, 1 ♀), Almus (Serince, 01.08.2001, 2 ♂, 4 ♀; Gevrek, 14.08.2001, 2 ♂, 1 ♀; Bakımlı, 22.08.2001, 2 ♂, 3 ♀), Niksar (Musapınarı, 16.07.2001, 2 ♂, 3 ♀; Şahinli, 27.06.2000, 1 ♂, 2 ♀), Turhal (Çaylı, 08.08.2000, 1 ♀; Çivril, 27.05.2001, 1 ♀; 19.06.2000, 1 ♂; Kalaycık, 14.08.2000 1 ♀; 28.05.2001 2 ♀), Pazar (Dereköy, 19.06.2000 3 ♂, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990a).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa, Nearctic Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Tribus: Paragini

***Paragus bicolor* (Fabricius, 1794)**

Material examined: Almus (Serince, 01.08.2001, 3 ♂; Gevrek, 14.08.2001, 3 ♂; Bakımlı, 22.08.2001, 2 ♂, 1 ♀), Niksar (Çerköy, 18.07.2001, 1 ♂; Musapınarı, 16.07.2001, 1 ♀), Tokat (Söngüt, 11.07.2001, 2 ♂, 2 ♀; Çördük, 05.07.2001, 3 ♂, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Kayseri (Bischof, 1902); Ankara, Akdeniz Region (Özgür 1986); Erzurum (Hayat & Alaoğlu 1990a); Kayseri, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, Asia, USSR, North Africa, Nearctic Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

***Paragus tibialis* (Falle'n, 1817)**

Material examined: Almus (Gevrek, 14.08.2001, 4 ♂, 1 ♀; Serince, 01.08.2001, 2 ♂; Bakımlı, 22.08.2001, 1 ♀), Niksar (Çerköy, 18.07.2001, 2 ♂; Musapınarı, 16.07.2001, 2 ♂), Turhal (Çaylı, 08.08.2000, 2 ♂), Tokat (Çördük, 05.07.2001, 2 ♂; Söngüt, 11.07.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972; Düzgüneş et al., 1982); Çukurova (Zeren & Düzgüneş, 1984); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990a); Kayseri, Kahramanmaraş, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa, Nearctic and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

***Paragus albifrons* (Falle'n, 1817)**

Material examined: Tokat (Çördük, 05.07.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Düzgüneş et al., 1982).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Bothe, 2000).

Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822

Material examined: Niksar (Musapınarı, 16.07.2001, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Izmir (Gül-Zümreoğlu, 1972); East Akdeniz Region (Yumruktepe &, Uygun 1994).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Predator on aphids (Shtakel' berg, 1988).

Tribus: Eumerini

Eumerus strigatus (Fallén, 1817)

Material examined: Tokat (13.04.1999, 1 ♀; Söngüt, 11.07.2001, 1 ♂), Turhal (Çaylı, 08.08.2000, 1 ♂), Almus (Gevrek, 14.08.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Turkey (no locality) (Sack, 1932); Manisa (Gül-Zümreoğlu, 1972); Çukurova Region (Özgür, 1987); Kayseri (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa, Nearctic Region (Peck, 1988).

Biology: Phytophag (Bothe, 2000).

Tribus: Eristalini

Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

Material examined: Tokat (05.08.1999, 1 ♂), Turhal (Çaylı, 11.06.2001, 1 ♂, 2 ♀).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Kayseri, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa, Nearctic, Afrotropical and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Material examined: Almus (Gevrek, 19.06.2000, 1 ♀), Tokat (Söngüt, 14.08.2000, 1 ♀; Akyamaç, 30.05.2001, 1 ♂), Turhal (Çaylı, 11.06.2001, 1 ♀; Çivril, 27.05.2001, 1 ♂, 1 ♀; Kalaycık, 14.08.2000, 1 ♂), Artova (Yağcımus, 22.06.2001, 5 ♀; Aktaş, 03.08.2000, 1 ♂, 3 ♀), Niksar (Şahinli, 27.06.2000, 1 ♂; 22.07.2001, 1 ♀), Zile (Ede, 06.06.2000, 2 ♂, 11.07.2001, 1 ♂; 1 ♀; 28.06.2001, 3 ♂, 1 ♀), Reşadiye (10.08.2000, 7 ♂, 6 ♀).

Distribution in Turkey: Kayseri (Bischof, 1902); Izmir (Gadeau de Kerville, 1939); Ankara (Tuatay et al., 1972); Adana, Antalya, Mersin, Antakya (Özgür, 1986); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990b); Kayseri, Kahramanmaraş, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)

Material examined: Zile (Ede, 06.06.2000, 3 ♂, 3 ♀; 11.07.2001, 1 ♂, 1 ♀; 28.06.2001, 3 ♂; Karayün, 27.06.2000, 1 ♂), Reşadiye (10.08.2000, 2 ♀), Niksar (Çerköy, 27.06.2000, 7 ♂, 5 ♀; Musapınarı, 27.06.2000, 1 ♂; Şahinli, 27.06.2000, 1 ♂, 2 ♀), Artova (Aktaş, 03.08.2000, 3 ♂, 1 ♀), Almus (Bakımlı, 07.06.2000, 1 ♂; Serince, 26.05.2000, 1 ♂; Gevrek, 05.09.1999, 1 ♂; 19.06.2000, 2 ♂, 1 ♀), Tokat (05.08.1999, 3 ♂, 8 ♀; Çördük, 05.07.2001, 1 ♂), Turhal (Çaylı, 25.05.2001, 1 ♂; Kalaycık, 14.08.2000, 1 ♀; 28.05.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972); Adana, Antalya, Mersin, Antakya (Özgür, 1986); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990b); Kayseri, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa, Nearctic and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Eristalis jugorum Egger, 1858

Material examined: Zile (Ede, 06.06.2000, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990b).

Distribution in the world: Europe, USSR (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Helophilus continuus Loew, 1854

Material examined: Turhal (Kalaycık, 14.08.2000, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990b).

Distribution in the world: USSR, Asia (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Myathropa florea (Linnaeus, 1758)

Material examined: Niksar (Musapınarı, 16.07.2001, 1 ♂, 1 ♀), Tokat (31.07.1999, 1 ♀; 02.08.1999, 1 ♂; 05.10.2001, 1 ♀), Almus (Serince, 01.08.2001, 1 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972); Akdeniz Region (Özgür, 1986); Kahramanmaraş, Kastamonu (Sarıbiyık & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Tribus: Mlesiini

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)

Material examined: Tokat (13.03.1999, 4 ♀; 20.04.1999, 5 ♀; 15.05.1999, 1 ♀; 20.07.1999, 5 ♂, 5 ♀; Çördük, 10.08.2000, 9 ♂, 2 ♀; 05.07.2001, 12 ♂,

2 ♀; Söngüt, 14.08.2000, 1 ♂; 11.07.2001, 10 ♂, 3 ♀; Akyamaç, 05.06.2000, 1 ♂; Dökmetepe, 14.08.2000, 3 ♂; 01.06.2001, 1 ♂), Niksar (Çerköy, 27.06.2000, 15 ♂, 11 ♀; Şahinli, 27.06.2000, 5 ♂, 1 ♀; 22.07.2001, 1 ♂; Musapınarı, 27.06.2000, 4 ♂; 16.07.2001, 2 ♂), Artova (Kabatepe, 03.08.2000, 1 ♂, 1 ♀; 14.06.2001, 10 ♂, 2 ♀; Aktaş, 03.08.2000, 4 ♂, 2 ♀; 20.06.2001, 8 ♂, 3 ♀; Yağcımusa, 22.06.2001, 8 ♂, 3 ♀), Pazar (Dereköy, 19.06.2000, 11 ♂, 4 ♀), Zile (Ede, 06.06.2000, 2 ♂, 2 ♀; 28.06.2001, 8 ♂, 1 ♀; Kireçli, 01.07.2001, 10 ♂, 1 ♀; Karayün, 27.06.2000, 4 ♀; 18.06.2001, 7 ♂, 2 ♀), Turhal (Çaylı, 08.08.2000, 6 ♂, 1 ♀; 25.05.2001, 1 ♂, 1 ♀; Kalaycık 14.08.2000, 3 ♂; 28.05.2001, 1 ♂), Almus (Serince, 26.05.2000, 1 ♀; 01.08.2001, 1 ♂; Gevrek, 19.06.2000, 3 ♂; 14.08.2001, 4 ♀; Bakımlı, 07.06.2000, 2 ♂; 22.08.2001, 4 ♂).

Distribution in Turkey: Ankara (Tuatay et al., 1972); Adana, Antalya, Mersin, Antakya (Özgür, 1987); Erzurum (Hayat & Alaoğlu, 1990b); Kayseri, Kahramanmaraş, Kastamonu (Saribiyik & Aktaş, 1996).

Distribution in the world: Europe, USSR, Asia, North Africa, Nearctic and Oriental Region (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous (Bothe, 2000).

Tribus: Chrysogasterini

Neoscias podagrica (Fabricius, 1775)

Material examined: Almus (Gevrek, 14.08.2001, 1 ♂), Niksar (Musapınarı, 16.07.2001, 1 ♂, 1 ♀).

Distribution in Turkey: Antalya, İçel, Adana (Özgür, 1987); Kastamonu (Saribiyik, 2001).

Distribution in the world: Europe, USSR (Peck, 1988).

Biology: Saprophagous, Phytophagous (Bothe, 2000).

Özet

Tokat ve Çevresinde Saptanan Syrphidae (Diptera) Türleri

Tokat ve çevresinde yapılan bu çalışmada Syrphidae (Diptera) familyasına ait 16 cins ve bu cinslere bağlı 28 tür tesbit edilmiştir. Bu türlerin dünyadaki ve Türkiye'deki dağılışı ile beraber beslenme rejimlerine yer verilmiştir.

Acknowledgements

We are grateful to Dr. Rustem HAYAT (Atatürk University Agricultural Faculty, Erzurum) for identifying of Syrphidae, contributing literatures and others.

This paper is dedicated to the memory of Prof. Dr. Fevzi ÖNDER who passed away in 25th March 2000.

References

- Alaoğlu, Ö. & H. Özbek, 1987. Erzurum ve çevresinde patateslerde bulunan avcı böcek türleri. **Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.**, **18** (1-4): 15-26.
- Atak, U., 1975. Marmara Bölgesinde lahana ve karnabaharlarda bulunan zararlılar ile integre savaş olanakları üzerinde araştırmalar. Proje A, 3. yıl raporu, İstanbul, 28 s.

- Bothe, G., 2000. Bestimmungsschlüssel für die Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Deutschlands und der Niederlande. Offsetdruckerei Hans-Jürgen Kappes Holstenstraße 216, Hamburg, 117 pp.
- Bischof, J., 1902. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annales des k.k. naturhistorischen Hofmuseums, 20: 1-9.
- Gadeau De Kerville., H.1939. Voyage Zoologique D'Henri Gadeau de Kerville an Asie Minor (April-Mai 1912). Paul le chevalier, Paris, 148 pp.
- Gül-Zümreoğlu, S., 1972. İzmir Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Böcek ve Genel Zararlılar Kataloğu. 1928-1969 (1. Kısım). Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü. Bornova- İzmir, 119 pp.
- Düzgüneş, Z., Toros, S., Kılınçer, N. & B. Kovancı, 1982. Ankara İlinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin Parazit ve Predatörleri. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zir. Müc. ve Zir. Karan. Gen. Müd., Ankara, 251 s.
- Erkin, E., 1983. Investigations of the host, distribution and efficiency of the natural enemies of the family Aphididae (Hom.) harmful to pome and stone fruit trees in İzmir province of Aegean Region. **Türk. bitki kor. derg.**, 7: 29-49.
- Güçlü, Ş., Hayat, R. & H. Özbek, 1994. Erzurum ve çevre illerinde bulunan predatör böcek türlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir, 44-47.
- Hayat, R., 1989. Erzurum Yöresi Syrphidae (Diptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistemik Çalışmalar. Atatürk Üniv. Zir. Fak., Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 72 s.
- Hayat, R. & Ö. Alaoglu, 1990a. Erzurum Yöresi Syrphidae (Diptera) faunası (I). Syrphinae. **Türk. entomol. derg.**, 14 (3): 173-182.
- Hayat, R. & Ö. Alaoglu, 1990b. Erzurum Yöresi Syrphidae (Diptera) faunası (2). Milesiinae. **Türk. entomol. derg.**, 14 (4): 22-234.
- Hurkmans, W. & R. Hayat, 1997. Ethology and ecology of Merodon (Diptera, Syrphidae) in Turkey II: descriptions of new species and notes on other Syrphid flies. **Dipterists Digest**, 3: 62-79.
- Özbek, H., Ş. Güçlü, R. Hayat, 1995. Kuzeydoğu Tarım Bölgesinde Taş Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Fitofag ve Predatör Böcek Türleri. **Tr. J. of Agriculture and Forestry**, 20: 267-282.
- Özgür, A.F., 1982. Akdeniz Bölgesi Kıyı Şeridi Syrphidae (Dip.) Faunasının sistematiği Doçentlik tezi, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Adana, 169 s.
- Özgür, A.F., 1986a. Akdeniz Bölgesi avcı Syrphidae türleri. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 12-14 Şubat 1986, Adana, 293-303.
- Özgür, A.F., 1986b. Akdeniz Bölgesi Kıyı şeridi Syrphidae (Diptera) faunası I. Altfamilya: Eristalinae, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana, 15 s.
- Özgür, A.F., 1987. Akdeniz Bölgesi Kıyı Şeridi Syrphidae (Diptera) faunası II. Altfamilya: Cheilosini, Sphegini, Pelecocerinae, Milesiinae, Chrysotoxinae, Volucellinae. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Adana, 2 (3): 67-81.
- Peck, V., 1988. Family: Syrphidae, In: A. SOOS and L.PAPP. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Diptera. Syrphidae- Conopidae. 8, 11-230. Budapest.
- Pehlivan, E. & N. Akbulut, 1990. Karaburun ve yöresinde nergislerde zararlı Syrphidae familyası türleri, **Merodon eques** (F.)'in biyolojisi ve savaş yöntemleri üzerinde araştırmalar. **Tr. J. of Agriculture and Forestry**, 15: 470-481.

- Sack, P., 1932. Syrphidae. In Lindner, Die Fliegen der Palaearctischen Region, 4 (31), 451 pp.
- Sarıbıyık, S., 2001. New records of the subfamily Milesiinae (Diptera: Syrphidae) from Turkey. **J. Ent. Res. Soc.**, 3 (3): 43-51.
- Sarıbıyık, S. & M. Aktaş, 1996. Türkiye Syrphidae (Diptera) faunasına Katkılar (Diptera: Syrphidae) (I). Syrphidae. **Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi**, 9 (1): 1-27.
- Sarıbıyık, S. & A. Hasbenli, 1997. Türkiye Syrphidae (Diptera) Faunası için yeni kayıtlar. **Türk. entomol. derg.**, 21 (3): 225-232.
- Simic, S. & S. Glumac, 1987. The Syrphid fauna of Montenegro (Insecta: Diptera): A zoogeographical analysis within the Balkan Peninsula. *Biologia Gallo-hellenica*, Kammenia Vourla, 13, 99-102.
- Soydanbay-Tunçyürek, M., 1976. Türkiye'de Bitki Zararlısı Bazı Böceklerin Doğal Düşmanları. **Bitki Koruma Bülteni**, 16 (1): 32-46.
- Tuatay, N., A. Kalkandelen, N. Aysev, 1972. Nebat Koruma Müzesi Böcek Kataloğu. T.C. Tarım Bak. Zir. Müc. Zir. Karan. Gen. Müd. Yayınları, Ankara, 119 s.
- Yumruktepe, R. & N. Uygun, 1994. Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde saptanan yaprakbitti (Hom: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir, 1-12.
- Weyer, G. & J. Dils, 1999. Contribution to the knowledge of the Syrphidae from Greece (Diptera: Syrphidae). **Phegea** 27 (2): 69-77.
- Zeren, O. & Z. Düzgüneş, 1984. Çukurova Bölgesinde sebzelerde zararlı olan Aphidoidea türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, **Türk. bitki kor. derg.**, 7 (3): 204-207.
- Zeren, O. & C. Yavaş, 1987. Akdeniz Bölgesi'nde patates (*Solanum tuberosum*) bitkisinde görülen zararlı, faydalı böcek ve akar faunası üzerinde çalışmalar. Türkiye I. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 13-16 Ekim 1987, İzmir, 675-684.
- Zeren, O., 1989. Çukurova Bölgesinde Zararlı Olan Yaprakbitleri (Aphidoidea) türleri, Konukçuları, zararları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman ve Köyşleri Bakanlığı, Ankara. pp: 157-166.